

FUNGICIDA
SUSPENSION CONCENTRADA (SC)
N° de Registro: 261-F1/NA
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

PYRIMETHANIL	400 g/L
DIFENOCONAZOLE	100 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

GENERALIDADES:

SURANO® es un fungicida sistémico cuyo mecanismo de acción es Inhibir la secreción de las enzimas del hongo, requeridas para el proceso de infección. La alimentación del hongo es bloqueada evitando el crecimiento del micelio y la esporulación.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	P.C (Periodo de carencia)
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0,75	0 día

GASTO DE AGUA: 60 litros de agua por hectárea en aplicación terrestre y 20 litros de agua por hectárea en aplicación aérea.

RESTRICCIONES DE USO: No aplicar.

MODO DE EMPLEO:

En aplicaciones terrestres aplicar **SURANO®** en 32 L agua/ha. Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de **SURANO®**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. Mantenga la mezcla en agitación durante su preparación y aplicación. Calibre el equipo de aplicación terrestre para dar un gasto de agua según fenología del cultivo, asegurando una buena cobertura.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

BANANO: Cuando aparezcan los primeros signos de la enfermedad en particular cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de los hongos, es decir con humedades relativas altas y temperaturas con rangos de variación altos. Aplicar máximo 2 veces por temporada. Intervalos de aplicación de 7 días de acuerdo a programa, rotar con diferentes ingredientes activos para evitar resistencias.

PERIODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO): 4 horas (Banano).

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de usos común. Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo en caso de ingestión. Nocivo si se inhala. Nocivo en contacto con la piel. Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Pyrimethanil: Anilino pirimidina; Difenconazole: Triazol

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL.

SÍNTOMAS: irritación salivación, náuseas, vómitos, salivación y diarrea.

TRATAMIENTO MÉDICO y ANTÍDOTO: Tratamiento sintomático, no existe antídoto específico. “En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda”.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

“Este producto puede ser mortal si se ingiere”. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón.

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”.

“NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”.

“NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda”.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Muy Tóxico para organismos acuáticos. No permita que el producto contamine canales, aguas corrientes, aguas estancadas o el suelo. “Evite aplicar en suelos livianos o arenosos, ya que puede ocurrir contaminación de las aguas subterráneas”. En caso de escape o derrame, recoja con tierra seca, aserrín o arena. Almacene en contenedores marcados y dispóngalos de acuerdo con las regulaciones locales vigentes. “No permita que el producto contamine cuerpos de agua ni el suelo”. Evite contaminar fuentes de agua con el producto o sus residuos. “Respete una franja de seguridad mínima tanto para aplicaciones terrestres y aéreas de 50m y 60m sin barreras vivas respectivamente y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano”.

Importado y distribuido por:

Titular del registro:

AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús,
conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3
Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: 6020273
Email: agrochile@anasac.cl

CATEGORÍA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”**

PELIGRO

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.