

"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

TACORA®

Fungicida Agrícola

EMULSION ACEITE EN AGUA (EW)

Composición

Tebuconazole.....	250 g/L
Dimetilformamida.....	400 g/L
Aditivos.....	c.s.p. 1 L

Registro Nacional: 71 – F5 / NA

Titular del Registro: **AGROCHILE S.A.**

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito - Ecuador. Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:



ANASAC CHILE S.A.

Almirante Pastene 300, Providencia,
Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800
Fax: (56-2) 24869100

Importado y Distribuido por:



El compadre del agro

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio
Arosemena N° 1-6-7 intersección av. 38C MZ. 263
Teléfono: (042) 590 600 Fax: ext. 172

**ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP
SCIENCE CO., LTD.**

Town South Donghua District. Longyou County, Zhejiang.
China. ZIP: 324400
Teléfono: +86 (0) 570-785 5158
Fax: +86 (0) 570-785 5632

CONTENIDO NETO:

LOTE N°:

Fecha de elaboración:

Fecha de vencimiento:

P.V.P.:

Líquido combustible.

Noçivo en caso de ingestión.
Noçivo en contacto con la piel.
Noçivo si se inhala.

Tóxico para los organismos
acuáticos.



ATENCIÓN

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Causa irritación moderada a los ojos. Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO. Cuidado, evite el contacto, POSIBLE Teratogénico”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

GRUPO QUIMICO: Tebuconazole: Triazole

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, remover los después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán de utilizarse nuevamente. En caso de ingestión, “NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL”. **SÍNTOMAS:** Moderada irritación ocular. Irritación dermal y nasal, dolor abdominal, anorexia, sedación, incoordinación locomotora, dolor al caminar, pérdida de peso. Posible hipertrofia del hígado (congestión centrilobular) y del bazo. En caso de inhalación se presenta irritación de las vías respiratorias. En caso de contacto puede haber irritación dermal y ocular. **TRATAMIENTO:** Realizar tratamiento sintomático (Control de posible irritación gástrica. Respiración artificial y si es necesario oxígeno terapia. **ANTIDOTO:** No tiene antidoto específico. El tratamiento médico debe ser sintomático y de sostén.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD: “Este producto puede ser mortal si se ingiere”. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. “ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”. “NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”. “NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: “En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda”



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 – VENENO (836366) Atención las 24 horas del día ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inútilcelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Tóxico para organismos acuáticos “No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos”. Respete una franja de seguridad tanto para aplicaciones aéreas y terrestres de 80m y 50m sin barreras vivas respectivamente y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. “Ligeramente toxico para abejas”, “No aplicar el producto en época de floración” y “No aplicar durante horas de polinización o actividad de las abejas”.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MODO Y MECANISMO DE ACCION: TACORA® es un fungicida sistémico con acción protectora, curativa y erradicante.

MODO DE EMPLEO:

Para preparar la mezcla adicionar la dosis requerida al tanque de aspersión conteniendo la mitad de agua a usar, agitándolo continuamente hasta lograr una suspensión homogénea, completar luego el resto del agua.

Para el caso específico de banano:

Suspensión: Agregar la dosis recomendada de TACORA® en el tanque de mezcla, que contenga la cantidad de aceite agrícola necesario (3,5 – 4 galones/ha) y agitar de 10 a 15 minutos.

Emulsión: Agitar la cantidad de aceite agrícola recomendado (1,5 – 2,0 galones/ha), agregar un emulsificante (1% del volumen de aceite recomendado) y agitar por 5 minutos. Posteriormente, añadir la dosis señalada de TACORA® y agitar por 5 minutos. Finalmente, completar con agua hasta obtener el volumen deseado y agitar por 10 a 15 minutos.

CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	Periodo de carencia
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella</i> <i>fijiensis</i>)	0.40	0 días
Tomate riñón (<i>Lycopersicon</i> <i>esculentum</i>)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.75	7 días

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Para banano se recomienda aplicar el producto TACORA® en dos ocasiones, con intervalos de catorce (14) días.

Para tomate riñón se recomienda aplicar el producto TACORA® en dos ocasiones, con intervalos de siete (7) días.

PERIODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO): Es recomendable guardar un periodo mínimo de 4 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: No produce fitotoxicidad sobre los cultivos recomendados, si se siguen fielmente las instrucciones dadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: TACORA® es Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pHs sean mayores a 9 o menores a 4.

RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORÍA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO

