

“CONSERVESE EN UN LUGAR CERRADO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
“NO INGERIR”



Bioestimulante Orgánico
Aplicación Foliar

Composición:

Extracto de Algas	49,9%	p/p
Potasio (K ₂ O)	4,7%	p/p
Boro (B)	0,031%	p/p
Hormonas		
Citoquininas	0,024 %	p/p
Auxinas	0,024 %	p/p
Giberelinas	0,0008 %	p/p
Betainas	0,032 %	p/p
Carbohidratos		
Manitol	1,9 %	p/p

Gracias al extracto de algas, favorece procesos metabólicos y fisiológicos de la planta

PROCESO DE FABRICACIÓN: Formulación líquida SL
CONTENIDO NETO: 500 ml, 1L, 5L, 10L, 20L y 200L

FABRICANTE Y FORMULADOR:



Anasac Chile S.A.

Almirante Pastene 300, Providencia.
Santiago-Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800

TITULAR DEL REGISTRO:



AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de
Jesús, conjunto La Granja Bloque ED
231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito,
Ecuador. Teléfono: 6020273
Email: agrochile@anasac.cl

Forma de aplicación: El producto puede ser aplicado vía foliar, mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelos.

Equipo de aplicación: A pesar de que el producto es inocuo y no presenta un peligro para el aplicador deben ser tomadas las precauciones siguientes: Durante el manejo y lavado del equipo de aplicación, se debe utilizar el equipo de protección completo: pantalón largo, camisa manga larga, botas de hule, mascarilla, protector de ojos y guantes

RECOMENDACIÓN DE USO:

“CONSULTE CON UN TECNICO PROFESIONAL”

CULTIVOS	DOSIS	EPOCA DE APLICACIÓN	FRECUENCIA DE APLICACIONES
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	500 cc/200L agua	Al inicio de la floración de racimos.	3 aplicaciones
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	1l/ha / 60-80 litros de agua	En fase de desarrollo vegetativo	6 aplicaciones

“La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con las condiciones fisiológicas de la planta y condiciones de clima”

PRECAUCIONES: Durante la preparación y utilización del producto “NO COMER, BEBER O FUMAR”. USAR ropa protectora adecuada guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc. ANTES DE COMER, BEBER O FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón. “Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales”. “No permita animales en el área tratada”. “No contaminar fuentes de agua”. “Conserve el producto en el envase original etiquetado y sellado herméticamente”. “No emplear este envase para ningún otro fin”. “Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin”.


INCOMPATIBILIDAD: PHYLLUM es incompatible con productos de reacción alcalina y aquellos que contengan aceites, cobre o azufre. Mezclas ácidas pueden requerir un aumento en el pH. No se recomienda usar surfactante es en base a glicol. En caso de dudas sobre la compatibilidad consulte a ANASAC.



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: 1800 – VENENO (836366) Atención las 24 horas del día o al Titular del Registro AGROCHILE S.A. Tel: (593)2-6020273. Email: agrochile@anasac.cl

REGISTRO N°:
LOTE NÚMERO:
P.V.P.:

FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:



www.anasac.com/international