

TIAGO GOLD

FUNGICIDA

FORMULACIÓN: SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición Química:

AZOXISTROBÍN

methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3- methoxyacrylate 200 g/l

DIFENOCONAZOLE

1-[2-[2-chloro-4-(4-chloro-phenoxy)-phenyl]-4-methyl[1,3]dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole 125 g/l

Inertes 675 g/l

¡ALTO! “LEA LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Formulado por:

ANASAC CHILE S.A.

Almirante Pastene No. 300 – Providencia.
Santiago – Chile - Casilla 36-V

GLEBA S.A.

Avda. 520 y Ruta Prov. 36 N° 9497(1903)
Melchor Romero. La Plata. Prov. De Bueno
Aires, Argentina. Tel: (0221) 491 3062

ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.

Town South, Donghua District, Longyou County.
Zhejiang, China. ZIP: 324400.
Tel: 86-(0)570-7855158

Contenido neto:

Fecha Fabricación:

Fecha Vencimiento:

Lote N°:

Titular de Registro:



ANASAC BOLIVIA S.R.L

Barrio Casco Viejo. Calle Mercado N°457.
Edif: Mall calle 7, Of.6. UV:0000 MZA: 79
Tel: 591 3 3577105 Santa Cruz. Bolivia.

REGISTRO SENASAG N°: 3169

USO AGRICOLA

NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO – NO INFLAMABLE

LIGERAMENTE PELIGROSO - CLASE III



CUIDADO



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA

GRUPO QUIMICO: Estrobilurina y Triazol

Durante la manipulación, usar los elementos de protección adecuada: guantes de neopreno, botas de goma, antiparras y máscara con filtros. Antes de abrir el envase, lea cuidadosamente la etiqueta del producto. El producto de ser manipulado por personal entrenado y consciente del riesgo que implica. No debe ser manipulado por ancianos y niños. Manipular el producto en lugares bien ventilados. Después de manipular el producto los usuarios deben lavarse bien las manos y las partes del cuerpo que entraron en contacto con el producto. Los usuarios deben lavarse bien las manos antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto cutáneo: retirar la ropa y zapatos contaminados. Luego lavar las zonas afectadas (piel, cabello) con abundante agua y jabón. **En caso de contacto ocular:** lavar los ojos con agua potable o limpia, por 10 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. **En caso de inhalación:** llevar al paciente a un lugar sombrío, con aire fresco y manténgalo en reposo. Si se presenta falla respiratoria, aplicar respiración artificial boca a boca. **En caso de ingestión:** lavar la boca con agua para remover los restos del producto. Si el paciente está consciente, administrar 2 tazas de agua y proceda a provocar el vómito. Trasladar al paciente al hospital más cercano. Si es posible lleve la etiqueta o el envase del producto.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: No se dispone de un antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua, inutilizar los envases vacíos y entregarlos al centro autorizado de acopio de envases vacíos de agroquímicos. **TIAGO GOLD** es moderadamente tóxico para organismos acuáticos y peces, ligeramente tóxico para aves.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS"
"EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"

"REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS"

"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"

"NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO"

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL TELEFONO 800-10-6966 CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL JAPONES, SANTA CRUZ, BOLIVIA.

Nota al comprador: El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo, no ofrece garantía por el resultado del producto ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis considerando las tolerancias de residuos que la etiqueta indica, siguiendo las recomendaciones de la misma. El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción, puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alteren su modo de acción. Gieba no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.

GENERALIDADES

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

"ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

TIAGO GOLD es un fungicida de amplio espectro, con acción preventiva y curativa. Corresponde al grupo de las estrobilurinas. Inhibe la germinación de las esporas y estados tempranos de desarrollo de hongos, crecimiento del micelio y la esporulación. A esto se adiciona un triazol (difenoconazole) que es un inhibidor de la síntesis del ergosterol, componente de las membranas celulares de los hongos lo que inhibe el desarrollo del tubo germinativo y crecimiento micelial.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo	Enfermedades	Dosis	Época de Aplicación
Tomate <i>(Lycopersicon esculentum)</i>	Tizón Temprano <i>(Alternaria solani)</i>	90 cc/100 litros de agua	Aplicar de forma preventiva

CONDICIONES EN QUE EL PRODUCTO PUEDE SER UTILIZADO:

Temperatura ambiente. Por debajo de 32°C; Humedad relativa del aire: mínima de 60%; velocidad del viento por encima de 2 km/h hasta un máximo de 10 km/h.

NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN: **TIAGO GOLD** debe ser aplicado con niveles iniciales de infección o cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicar hasta dos veces, con intervalo de 7 a 10 días entre aplicaciones.

METODOS DE APLICACIÓN: Antes de utilizar el producto, agite el envase. **TIAGO GOLD** puede aplicarse con equipo terrestre de arrastre, aspersora de mochila o equipo accionado por tractor, con barras provistas de boquillas de cono hueco para fungicidas para lograr un tamaño de gota que llegue a todas las partes verdes de la planta. Utilizar un volumen mínimo de agua de 150 litros/ha., para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. **TIAGO GOLD** también puede aplicarse por avión empleando un volumen mínimo de agua de 30 litros/ha. Asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado y calibrados para una buena distribución y tamaño de la gota uniforme.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: agregar la dosis **TIAGO GOLD** en el estanque de mezcla con la mitad de volumen de agua, mantener el caldo con agitación continua durante toda la preparación hasta obtener una solución estable y homogénea. Completar el estanque con agua limpia. Si utilizará un surfactante no iónico, mézclelo en el estanque al último y vuelva a agitar la mezcla.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos con pH mayor a 11 o menor a 2. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Cuando se desea realizar mezclas con otros productos, hacer pruebas de compatibilidad previamente.

FITOTOXICIDAD: Bajo las condiciones y dosis recomendadas **TIAGO GOLD** no provoca fitotoxicidad.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: No afecta los cultivos siguientes, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas. **PERIODO DE CARENANCIA:** 7 días



CUIDADO

