

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADEVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN** Nocivo por ingestión. Nocivo por inhalación. Irrita los ojos. Irrita la piel, El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Evitar la inhalación del polvo de aspersión y el contacto dermal.

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

## **"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"**

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:** Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

**MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de **INHALACIÓN:** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de **CONTACTO CON LA PIEL:** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de **CONTACTO CON LOS OJOS:** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de **INGESTIÓN:** no induzca el vómito.

**TRATAMIENTO Y ANTIDOTO:** No existe antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta"

**EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: 1800 – VENENO (836366) Atención las 24 horas del día**  
ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

### **MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICION DE ENVASES VACIOS:**

Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturándolo o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

### **MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

CIGARAL es moderadamente tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces y especies acuáticas. Altamente Tóxico para abejas, aplicar el producto en las primeras horas de la mañana o altas horas de la tarde. No aplicar durante la floración.

# CIGARAL

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

### **Composición**

Imidacloprid .....	350 g/l
Aditivos .....	1.0 l c.s.p

**Registro Nacional: 68- 18/NA**

**CONTENIDO NETO:**

LOTE N°:

Fecha de formulación:

Fecha de Vencimiento:



P.V.P.

Titular del Registro: **AGROCHILE S.A.**

Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln. Torre 1492, piso 10, of. 1005,  
Quito, Ecuador. Tel: (593) 2-6020273 Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

**Formulado por:**

**Importado y Distribuido por:**

	
Almte Pastene 300. Providencia. Stgo. Chile Tel. 562.24706800 / Fax: 562 24869100	Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7 intersección av.38C MZ. 263 Tel: (042) 590 600 Fax: ext. 172

### **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CIGARAL** es un insecticida selectivo que actúa en forma sistémica por contacto e ingestión, recomendado para el control de Mosca blanca en el cultivo de tomate riñón en invernadero.

**MODO DE EMPLEO:** Se aplica en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas según la dosis anotada en el cuadro adjunto. Debido a su acción de contacto, se necesita que todo el tejido vegetal sea asperjado. Para preparar la mezcla de aspersión llenar el tanque del equipo de aspersión con agua hasta la mitad, agregar la dosis correcta del producto, agitar moderadamente y completar el volumen de agua. Aplicar siguiendo Las recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo, de acuerdo al grado de infestación y el daño generado en el cultivo. Aplicar con boquilla de insecticida, evitando la deriva hacia cultivos susceptibles.

### **"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

<b>CULTIVOS</b>	<b>PLAGAS</b>	<b>DOSIS (l/ha)</b>	<b>PERÍODO DE CARENIA</b>
Tomate Riñón ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Mosca blanca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i> )	0,4	10 Días

**Período de Carencia:** días desde la última aplicación a la cosecha  
Utilizar descarga aproximada de agua de 400 l/ha.

**RESTRICCIÓN DE USO:** Para control de mosca blanca en tomate riñón bajo invernadero.

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Aplicación foliar temprana cuando se observe movimiento de los primeros insectos. Se aplica por dos ocasiones con intervalo de 8 días entre aplicaciones.

**PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Se recomienda guardar un período de 24 horas para reingresar al área tratada.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta efectos fitotóxicos si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos de reacción fuertemente ácida o alcalina.

**RESPONSABILIDAD:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la Etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II: MODERADAMENTE PELIGROSO**



**DAÑINO**

