

CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

CRECITEC Ca

Composición:

Calcio (Ca) 7,0 % p/p
Nitrogeno total (N) 4,9 % p/p

PROCESO DE FABRICACIÓN: Formulación líquida SL

CONTENIDO NETO:

Registro M.A.G.: 035254734

P.V.P.:

FABRICANTE Y FORMULADOR:



Anasac Chile S.A.
Almirante Pastene 300, Providencia.
Santiago – Chile

TITULAR DEL REGISTRO:

AGROCHILE S.A
Torre 1492 12 de Octubre y Lincoln,
N° N26-97, 5° Piso
Quito-Ecuador
Telefono: (02)298 66 77

IMPORTADOR:



FARMAGRO S.A
Vía Daule Km 7 1/2
Guayaquil –ECUADOR
Teléfono: (593) 04 225 6000
Fax: 04 225 6031

MODO DE EMPLEO: Forma de aplicación: El producto puede ser aplicado vía foliar o fertiriego, mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelos. Equipo de aplicación: A pesar que el producto es inocuo y no presenta un peligro para el aplicador deben ser tomadas las precauciones siguientes: Durante el manejo y lavado del equipo de aplicación, se debe utilizar el equipo de protección completo: Pantalón largo, camisa manga larga, botas de hule, mascarilla, protector de ojos y guantes

PRECAUCIONES: No aplicar en horas de máximo calor. Almacenar en este mismo envase en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. Puede irritar la piel y los ojos.

INSTRUCCIONES DE USO: 1 – 2 Lts/200 Lts de agua

CULTIVO	RECOMENDACIONES DE USO
Arroz	Aplicar en periodo de formación y llenado de grado.
Tomate, Ajíes	Aplicar después de trasplante (15 días), con intervalos de 15 días. En periodo de producción aplicar cada 7 días.
Papa	Aplicar en los primeros estados. Repetir aplicaciones según necesidad del cultivo.
Ajíes, Melón, Sandía	Aplicar después de trasplante (15 días), con intervalos de 15 días. En periodo de producción aplicar cada 7 días.
Frutales y Cítricos	Aplicar después de trasplante (15 días), con intervalos de 15 días. En periodo de producción aplicar cada 7 días.
Otras hortalizas: Col, Coliflor, Brócoli, Zanahoria, Apio	Aplicar desde los 21 días, cada 15 días.
Ajo, Cebolla	Aplicar después de trasplante (15 días), con intervalos de 15 días. En periodo de producción aplicar cada 7 días.
Bananos y Plátanos	Aplicar a partir del tercer mes de establecidas las plantas en intervalos de 15 días hasta la salida del cultivo.
Uva	Realizar 2 a 4 aplicaciones a partir de preflor.
Café, Cacao	Realizar 2 aplicaciones a partir de cuajado de fruto.
Fresa, Arándano, Frambuesa	Realizar 2 a 3 aplicaciones a partir de frutos cuajados en desarrollo intermedio, repitiendo cada 7 días.

FUNCIÓN: CRECITEC Ca es un abono foliar a base de N y Ca. Desde el punto de vista nutricional aporta Calcio (Ca), además de corregir deficiencias de estos elementos durante las etapas de mayor consumo, potencia los sistemas naturales de defensa de las plantas. Debido a su novedosa formulación de alta absorción y compatibilidad, le confiere buena sistemía, pues sus elementos son asimilables en su totalidad. CRECITEC Ca puede ser aplicado vía foliar. Proporciona una elevada respuesta en diferentes cultivos al favorecer procesos metabólicos y fisiológicos.

COMPATIBILIDAD: CRECITEC Ca es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes de uso común, salvo los de reacción muy alcalina. CRECITEC Ca debe ser aplicado en solución con pH entre 5 a 8.

LOTE NÚMERO:

FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE FORMULACIÓN:

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL

