

“CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”



FERTILIZANTE INORGÁNICO
Aplicación Foliar y Fertirriego

Composición:

Potasio disponible (K₂O) 20.0% p/p

PROCESO DE FABRICACIÓN: Formulación líquida SL

CONTENIDO NETO:

FABRICANTE Y FORMULADOR:



Anasac Chile S.A.

Almirante Pastene 300, Providencia.
Santiago-Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800

TITULAR DEL REGISTRO:



AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de
Jesús, conjunto La Granja Bloque ED
231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito,
Ecuador. Teléfono: 6020273
Email: agrochile@anasac.cl

MODO DE EMPLEO:

Forma de aplicación: El producto puede ser aplicado vía foliar o fertirriego, mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelos. Equipo de aplicación: A pesar que el producto es inocuo y no presenta un peligro para el aplicador deben ser tomadas las precauciones siguientes: Durante el manejo y lavado del equipo de aplicación, se debe utilizar el equipo de protección completo: Pantalón largo, camisa manga larga, botas de hule, mascarilla, protector de ojos y guantes.

INSTRUCCIONES DE USO: Dosis para 200 litros de agua

CULTIVO	DOSES	EPOCA DE APLICACIÓN	VÍA DE APLICACIÓN
Frutales	1 a 2 L/ha.	Efectuar 2-3 aplicaciones, desde frutos cuajados hasta inicio de formación de color en frutos.	vía foliar o fertirriego
Café (<i>Coffea arabica</i>), Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	1 a 2 L/ha.	Efectuar 2-3 aplicaciones con frutos cuajados	vía foliar o fertirriego
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	1 a 2 L/ha.	Efectuar 2-3 aplicaciones con frutos cuajados	vía foliar o fertirriego
Ajo (<i>Allium sativum</i>), Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	1 a 2 L/ha.	Aplicar 30 y 15 días antes de cosecha	vía foliar o fertirriego
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>).	1 a 2 L/ha.	1ª Al inicio de formación de los estolones, 2ª Al inicio del crecimiento de los tubérculos	vía foliar o fertirriego
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	1 a 2 L/ha.	Realizar aplicaciones al inicio de emisión de panoja	vía foliar o fertirriego
Melón (<i>Cucumis melo</i>), Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)	1 a 2 L/ha.	Aplicar desde fructificación a fin de cosecha	vía foliar o fertirriego
Otras Hortalizas	1 a 2 L/ha.	Aplicar durante amarre de fruto	vía foliar o fertirriego
Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Arveja (<i>Pisum sativum</i>)	1 a 2 L/ha.	Realizar aplicación posterior al cuajado	vía foliar o fertirriego
Cítricos	1 a 2 L/ha.	Realizar de 2 a 3 aplicaciones con frutos cuajados	vía foliar o fertirriego
Uva (<i>Vitis vinifera</i>)	1 a 2 L/ha.	En variedades de color efectuar de 2 a 3 aplicaciones desde bayas de 5 mm hasta pinta	vía foliar o fertirriego
Fresa (<i>Fragaria x ananassa</i>), Arándano (<i>Vaccinium myrtillus</i>), Frambuesa (<i>Rubus idaeus</i>)	1 a 2 L/ha.	Realizar de 2 a 3 aplicaciones con frutos cuajados.	vía foliar o fertirriego

“La información presentada sirve como referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”

PRECAUCIONES: No aplicar en horas de máximo calor. Almacenar en este mismo envase en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. Puede irritar la piel y los ojos”

COMPATIBILIDAD: CRECITEC K es incompatible con productos de reacción muy alcalina. CRECITEC K debe ser aplicado en solución con pH entre 5 a 8.



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: 1800 – VENENO (836366) Atención las 24 horas del día o al Titular del Registro AGROCHILE S.A. Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

N° de REGISTRO : 2153-F-AGR
FECHA DE FORMULACIÓN :
FECHA DE VENCIMIENTO :
LOTE NÚMERO :
P.V.P. :



www.anasac.com/international