

# MOXAN MZ

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

## Composición:

Mancozeb.....	640 g/kg
Cymoxanil.....	80 g/kg
Excipientes.....	c.s.p. 1 kg
Ethylene thiourea ETU: 0,035%	

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**No. REGISTRO NACIONAL: 058-F 9/NA**

## CONTENIDO NETO:

Lote No.:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

## Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln. Torre 1492, piso 10, of. 1005,  
Quito, Ecuador. Tel: (593) 2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:



**Zhejiang Longyou East Anasac  
Crop Science Co., Ltd.**

Town South Donghua District, Longyou County. Zhejiang China  
Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y Distribuido por:



**Asproagro S.A.**

Mercadillo 007 y Paez  
Edificio Doral Mariscal 6to piso of 65  
Quito-Ecuador  
Tel.: 022-908235

## CUIDADO



**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:**

Evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos.

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”**

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO**

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

**MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de INHALACIÓN:** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

**En caso de CONTACTO CON LA PIEL:** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

**En caso de CONTACTO CON LOS OJOS:** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

**En caso de INGESTIÓN:** no induzca el vómito.

Tratamiento: No tiene antídoto específico. Los síntomas probables de ingestión son dolor faríngeo, vómitos y diarrea. El tratamiento debe ser sintomático y de sostén.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa cuando corresponda”



**EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: 1800 – VENENO (836366)** Atención las 24 horas del día ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICION DE ENVASES VACIOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilice cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

Es prácticamente no tóxico para aves, moderadamente tóxico para peces microcrustáceos acuáticos y no tóxico para abejas No contaminar ríos, lagos, o fuentes de agua. No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**MOXAN MZ** es un fungicida con acción sistémica y de contacto recomendado para el control de la Lancha o Tizón tardío en el cultivo de la papa.

**MODO DE EMPLEO:** Se aplica directamente sobre el follaje, diluyendo el producto en agua según la dosis recomendada, mediante equipos convencionales de aplicación. Poner agua en el tanque del equipo aplicador hasta la mitad, agregar la dosis requerida de **MOXAN MZ**, manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego llenar con agua hasta completar el volumen deseado. Lavar el equipo prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C.
PAPA ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Lancha o Tizón Tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> )	3,0 kg/ha (descarga de 800 litros de agua)	8 días

P.C.: Período de carencia (días desde la última aplicación a la cosecha).

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Aplicar cuando se presenten condiciones favorables a la enfermedad o al aparecer los primeros síntomas. Se recomienda realizar 2 aplicaciones con un intervalo de 10 días entre la primera y segunda aplicación. Es conveniente alternar con otros fungicidas de diferente modo de acción y composición química. Evitar aplicar con lluvias y vientos fuertes.

**PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Se recomienda guardar un período de 12 horas para reingresar al área tratada.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos fuertemente alcalinos. Ante dudas se recomienda efectuar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** No produce fitotoxicidad sobre el cultivo recomendado, si se siguen fielmente las instrucciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la Etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO**

**CUIDADO**

