

**"LEA CUIDADAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** "Tóxico por ingestión". "Peligroso si es inhalado". "Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)". "Irrita las vías respiratorias". "Evitar el contacto con la piel y la ropa".

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

### "EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

#### ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado

#### MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

En caso de **INHALACIÓN:** Retirar al paciente a un lugar fresco. Si este presenta dificultad respiratoria, busque o solicite inmediata atención médica.

En caso de **CONTACTO CON LA PIEL:** Retirar la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua y jabón y prestar atención médica.

En caso de **CONTACTO CON LOS OJOS:** lavar bien los ojos con solución isotónica.

En caso de **INGESTIÓN:** Si el producto es ingerido y la persona esta consciente: administrar una taza de agua y no provocar al vómito. Luego trasladar al paciente al lugar más cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto.

**SÍNTOMAS:** dolor de cabeza, mareos, debilidad y náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal.

**TRATAMIENTO MÉDICO y ANTÍDOTO:** Considere la posibilidad de la terapia con medicamentos para el edema pulmonar. Administración de un agonista beta como el albuterol para el broncoespasmo severo. Utilice solución salina al 0.9% (NS) o Ringer lactato si se presentan signos de hipovolemia. Tratar las convulsiones con diazepam o lorazepam. Utilice clorhidrato de propofol para ayudar a la irrigación ocular. No tiene antídoto específico. **En caso de INTOXICACIÓN llame al MÉDICO inmediatamente, o lleve al paciente al MÉDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA y la hoja informativa adjunta.**

 **EN CASO DE EMERGENCIAS LLAME AL:** 1800 – VENENO (836366) Atención las 24 horas del día ó al titular del registro: **AGROCHILE S.A.** Teléfono: 593-2-6020273. Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

#### MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICION DE ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

#### MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

"No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Realizar las aplicaciones con el volumen de agua recomendado para evitar el escurrimiento" "Realizar la aplicación en un suelo a capacidad de campo" "Realizar dos aplicaciones por ciclo de cultivo" "Evitar las aplicaciones cuando el suelo se encuentre saturado o este lloviendo" "Incorporar materia orgánica durante la preparación de suelo para favorecer la rápida degradación de los ingredientes activos". "Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo" Respete una franja de seguridad mínima tanto para aplicaciones aéreas y terrestres de 60 y 50 m respectivamente sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

# NUNCHAKU

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:	Concentración
Azoxystrobin .....	200 g/l
Tebuconazole .....	125 g/l
Aditivos c.s.p. ....	1 l

Registro Nacional: 179-F2/NA

#### CONTENIDO NETO:

LOTE No:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

**P.V.P.**

**Titular del Registro: "AGROCHILE S.A."**

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús,

conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S.

Quito, Ecuador. Tel: (593) 2-6020273. Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

Formulado por:  
  
**ANASAC CHILE S.A**  
Almirante Pastene 300, Providencia,  
Santiago, Chile.  
Teléfono: (56-2) 24706800  
Fax: (56-2) 24689100  
**Zhejiang Longyou East Anasac  
Crop Science Co., Ltd.**  
Town South Donghua District, Longyou County.  
Zhejiang China  
Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y Distribuido por:  
  
El compañero del agro  
Ciudadela Los Vergeles calle 23 a  
Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7  
intersección av. 38C MZ. 263  
Teléfono: (042) 590 600 Fax: ext. 172

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

#### MODO DE EMPLEO:

Para su preparación en un recipiente pequeño con agua acidificada el pH a 5.5, seguido aplicar un dispersante para permitir una distribución homogénea del producto sobre la superficie foliar, a continuación colocar la dosis recomendada de **NUNCHAKU**, agitar hasta formar una suspensión homogénea, seguido completar el volumen de agua a usar, colocar en la bomba y aplicar usando el equipo de protección. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C.
Arroz ( <i>Oryza sativa L.</i> )	Pudrición basal ( <i>Rhizoctonia oryzae</i> )	0.75 cc/l ó 0.3 l/ha	35 días
Tomate Riñón ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Tizón Temprano ( <i>Alternaria solani</i> )	1.17 cc/l ó 0.35 l/ha	7 días
Rosas ( <i>Rosa sp.</i> )	Mildiu Polvoso ( <i>Oidium sp.</i> )	1.25 cc/l ó 1.88 l/ha	N/A
Maíz ( <i>Zea mays</i> )	Mancha de asfalto ( <i>Phyllachora maydis</i> )	2.50 cc/l ó 0.50 l/ha	15 días

Gasto de agua: Arroz: 400 l/ha. Tomate: 300 l/ha. Rosas: 1500 l/ha. Maíz: 200 l/ha  
P.C.: PERÍODO DE CARENANCIA

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Realizar la aplicación considerando siempre el umbral económico de la plaga en los cultivos (Arroz, Rosas y Tomate riñón), es decir cuando exista la presencia de lesiones ovaladas de 1-2 cm de largo por 0.5 cm de ancho, color verde pálido a blanco cremoso con bordes oscuros de Pudrición basal en la planta durante la etapa fenológica de desarrollo vegetativo, para que el producto ejerza tanto su modo como su mecanismo de acción. Maíz: aplicar via foliar, cuando exista máximo 2% de severidad. Arroz: Repetir la aplicación a los 14 días, no se recomienda hacer más de dos aplicaciones por ciclo. Tomate: Repetir la aplicación a los 7 días, no se recomienda hacer más de dos aplicaciones por ciclo. Rosas: Repetir la aplicación a los 7 días, no se recomienda hacer más de dos aplicaciones por ciclo. Maíz: Realizar dos aplicaciones con intervalos de 7 días.

**PERÍODO DE REINGRESO:** Al área tratada 12 horas después de la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** No se presentan problemas de fitotoxicidad para las dosis evaluadas.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos de pH menor a 3.0 y mayor a 10.

#### RESPONSABILIDAD.

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO**



# CUIDADO

