

TRONKAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición

Azoxystrobin.....	200 g/l
Difenoconazole.....	125 g/l
Aditivos c.s.p.....	1 l

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Registro Nacional: 143 – F3/NA

CONTENIDO NETO:

LOTE No.

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

P.V.P.

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED
231 Piso 3 Oficina 31 S. Pichincha, Quito, Ecuador. Tel: 6020273 Email:
agrochile@anasac.cl

Formulado por:



ANASAC CHILE S.A.

Almirante Pastene 300,
Providencia, Santiago, Chile.
Tel. (56-2) 24706800 - FAX: (56-2) 24869100

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.
Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang
China Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y distribuido por:



Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio
Arosemena N° 1-6-7 intersección av. 38 C MZ. 263
Teléfono: (042) 590 600 Fax: ext. 172

DAÑINO

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Peligroso si es inhalado. Evitar respirar polvo, vapor o aspersión.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). "Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y los animales". "No emplear este envase para ningún otro fin".

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: En caso de **inhalación**, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de **contacto con la piel**, retirese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de **contacto con los ojos**, lávelos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de **ingestión**, no induzca el vómito. **NOTA AL MÉDICO:** No existe antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. Ó llame a AGROCHILE S.A.
Teléfono: 593-2-6020273. Email: agrochile@anasac.cl

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilizándolo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: TRONKAL Ligeramente tóxico para aves, Moderadamente tóxico para peces y especies acuáticas. "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Realizar las aplicaciones utilizando equipos calibrados con la dosis y volumen de agua recomendadas para evitar el escurrimiento del producto". "Realizar la aplicación en un suelo a capacidad de campo y con un máximo desarrollo vegetativo en la planta". "Evitar las aplicaciones cuando el suelo se encuentre saturado o este lloviendo".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TRONKAL es un fungicida potenciado en base a dos ingredientes activos de eficaz acción sobre hongos, Azoxystrobin, potente inhibidor de la germinación de esporas y Difenoconazole inhibidor de la síntesis del ergosterol, del tubo germinativo y la síntesis del ADN del hongo. Ambos de tipo de acción sistémica, combinados generan una acción preventiva y curativa, además de erradicante aplicado en las dosis recomendadas.

MODO DE EMPLEO: Antes de utilizar el producto, agite el envase. Para la preparación, coloque la dosis indicada de TRONKAL en el estanque de mezcla con la mitad del volumen de agua aplicable, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. Si utilizará un surfactante no iónico, mézclelo en el estanque de último y vuelva a agitar la mezcla. TRONKAL puede aplicarse con equipo terrestre, aspersores de mochila o equipo accionado por tractor. Asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado y calibrados para una buena distribución y tamaño de la gota uniforme.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS (l/ha)	P.C (Período de carencia)
Arroz (<i>Oryza sativa</i> L.)	Pudrición de la vaina (<i>Sarocladium oryzae</i>)	0.50	28 días
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Oidio (<i>Didium</i> sp.)	1.50	N/A
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.40	14 días
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Mancha de asfalto (<i>Phyllachora maydis</i>)	0.40	35 días
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Mancha parda (<i>Alternaria longipes</i>)	0.40	14 días

***Volumen de agua:** Arroz y Tabaco: Descarga de 400 litros de agua, Rosa: Descarga de 1500 litros de agua, Tomate riñón: Descarga de 1600 litros de agua. Maíz: Descarga de 200 litros de agua por hectárea, previa calibración del equipo.

EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: **ARROZ:** debe ser aplicado con niveles iniciales de infección o cuando aparezcan los primeros síntomas. Se debe aplicar en dos ocasiones con intervalos de 7 días. **ROSA:** debe ser aplicado cuando exista la presencia de un 2% de la plaga como mínimo en las plantas. Se debe aplicar en dos ocasiones con intervalos de 7 días. **TOMATE RIÑÓN:** Se recomienda utilizar el producto cuando exista un máximo de 2 % de ataque. Se debe aplicar en dos ocasiones, con intervalos de 7 días. **MAIZ:** Realizar dos aplicaciones con intervalos de 7 días, aplicar via foliar, cuando exista máximo 2% de severidad. **TABACO:** Se recomienda utilizar el producto cuando exista un umbral de 2 % de ataque. Se debe aplicar en dos ocasiones, con intervalos de 7 días.

PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Es recomendable guardar un periodo mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de usos común. Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

RESPONSABILIDAD: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II MODERADAMENTE PELIGROSO

