

# TIAGO

FUNGICIDA SISTÉMICO

## SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

### Composición

Azoxystrobin .....	250 g/l
Aditivos c.s.p. ....	11

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Registro Nacional: 77-F12/NA

### CONTENIDO NETO:

LOTE No.

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

P.V.P.

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED  
231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador.  
Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

### Formulado por:


<b>ANASAC CHILE S.A.</b> Almirante Pastene 300, Providencia, Santiago, Chile. Tel. (56-2) 24706800 - FAX: (56-2) 24869100
<b>GLEBA S.A.</b> Av. 520 y Ruta Prov. 36, (1903) Melchor Romero La Plata- Prov. de Buenos Aires Tel.: (0221) 491 3062 - Fax: (0221) 491 6093 - E-mail: info@gleba.com.ar
<b>Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.</b> Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang, China, ZIP: 324400 Teléfono: +86 (0) 570-785 5158 Fax: +86 (0) 570-785 5632

### Importado y distribuido por:

 El compadre del agro
Ciudadela los Vergeles calle 23ª Dr. Carlos Julio Arosemena No. 1-6-7 intersección Av. 38C Mz263. Teléfono: (042) 590 600 Fax. 172 ext. 600.

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** Peligroso si es inhalado. Evitar respirar polvo, vapor o aspersión. "Causa irritación moderada a los ojos". "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas"

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:** Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). "Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y los animales". "No emplear este envase para ningún otro fin".

**MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retire la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión, Dar a beber agua solo si el afectado está consciente, no induzca el vómito. En todos los casos, trasladar de inmediato a un centro asistencial. **Síntomas:** Si es ingerido puede causar lesiones en el sistema digestivo, irritación en piel y ojos.

**NOTA AL MÉDICO:** No existe antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.** Ó llame al titular de registro: AGROCHILE S.A. Teléfono: 593-2-6020273. Email: agrochile@anasac.cl

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilizándolo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:** TIAGO Moderadamente tóxico para peces. "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Realizar las aplicaciones utilizando equipos calibrados con la dosis y volumen de agua recomendadas para evitar el escurrimiento del producto". Respete una franja de seguridad mínima tanto para aplicaciones terrestres de 50m sin barreras vivas respectivamente y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**TIAGO**, es un fungicida sistémico, protectante, erradicante y antiesporulante. Interfiere la respiración mitocondrial bloqueando la transferencia de electrones entre los citocromo b y c1 evitando la formación de ATP. Además que dificulta, si no impide, la aparición de resistencias cruzadas con otras familias de fungicidas.

**MODO DE EMPLEO:** Antes de utilizar el producto, agite el envase. Para la preparación, coloque la dosis indicada de **TIAGO** en el estanque de mezcla con la mitad del volumen de agua aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. **TIAGO** puede aplicarse con equipo terrestre, aspersores de mochila o equipo accionado por tractor. Asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado y calibrados para una buena distribución y tamaño de la gota uniforme.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C (Periodo de carencia)
Rosa ( <i>Rosa sp.</i> )	Mildíu vellosa ( <i>Peronospora sparsa</i> )	1,50 l/ha	No aplica
Banano ( <i>Musa acuminata</i> AAA)	Pudrición de la corona ( <i>Colletotrichum musae</i> )	0,40 ml/l	0 días
Uva ( <i>Vitis vinifera</i> )	Oídio ( <i>Oidium sp.</i> )	0,36 l/ha	14 días

\*Volumen de agua: Rosas: Descarga de 2000 litros de agua/ha. Banano: No Aplica, ya que el producto es utilizado en poscosecha.

**EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Rosas: Debe ser aplicado vía foliar, cuando exista la presencia de la plaga, considerando un umbral del 2% de severidad de ataque y procurando una buena cobertura en las plantas. Se debe aplicar en dos ocasiones con intervalos de 7 días. Banano: Aplicar en las heridas ocasionadas por el corte, al momento de la formación del clúster. Uva: Debe ser aplicado vía foliar, cuando exista la presencia de la plaga.

**PERÍODO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:** Es recomendable guardar un periodo mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pHs sean mayores a 9 o menores a 5. Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

**RESPONSABILIDAD:** "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

