

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.
PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADÉ EL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Predominan los efectos neurológicos causados por los ingredientes activos: Fipronil e Imidacloprid. Además, Fipronil puede provocar efectos a nivel del hígado y tiroides. La acción en la tiroides sería indirecta al interferir en la depuración biliar de la tiroxina y no a nivel de incorporación del yodo a esta hormona.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: Si la persona está consciente administre una tasa de agua y mantenga al paciente en reposo. Si es ingerido, no provoque vómitos ya que puede causar alteraciones pulmonares. Traslade inmediatamente al centro médico más cercano.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

EN CASO DE INHALACIÓN: retire al paciente a la zona contaminada y llévalo a un lugar seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y si es necesario aplique respiración artificial.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con abundante agua y jabón durante un tiempo mínimo de 15 minutos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO:

No provoque vómitos ya que pueden causarse alteraciones pulmonares. Luego mantenga al paciente en lugar protegido de la luz, mientras espera el traslado al hospital más cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto.

 **anasac**

MAGNETO 45 SC

INSECTICIDA - NEONICOTINOID, FENIL PIRAZOL
IMIDACLOPRID, FIPRONIL

Composición química:

	%m/v
(E)-1-(6-cloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine.....	35.00
5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfanylpyrazole-3-carbonitrile.....	10.00
Ingredientes inertes	75.00

Contiene: 450 gramos de ingredientes activos por litro de producto comercial.

DENSIDAD: 1,15 - 1,25 g/ml (a 20°C)

Contenido neto:

!

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:
ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP
SCIENCE CO., LTD.
Town South Donghua District, Longyou County,
Zhejiang, China.
Tel: +86-(0)570-7855158

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

TOXICO PARA PECES O CRUSTACEOS

TOXICO PARA ABEJAS

MANEJO DE ENVASES



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO,
CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo, no ofrece garantía por el resultado del producto, ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis, considerando las tolerancias de residuos y siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados, impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alternen su modo de acción. La empresa no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza

PAÍS
COSTA RICA
HONDURAS
GUATEMALA
NICARAGUA
PANAMA
REPÚBLICA DOMINICANA

NÚMERO DE REGISTRO
-
1044-294-III
894-29
ANA-07M-2014
6665
4583

N° DE LOTE:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: