

# ¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

TÓXICO PARA EL GANADO

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS

MANEJO DE ENVASES

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

**AVISO DE GARANTÍA:** El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo no ofrece garantía por el resultado del producto, ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis, considerando las tolerancias de residuos y siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados, impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alternen su modo de acción. La empresa no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.

PAÍS  
GUATEMALA

NÚMERO DE REGISTRO  
894 – 11

N° DE LOTE:  
FECHA DE FORMULACIÓN:  
FECHA DE VENCIMIENTO:



anasac

## TRAYER 42.07 SL

HERBICIDA – PIRIDINA, FENOXI  
PICLORAM, 2,4 - D

Composición química:

	%m/v
Acido 4-amino -3,5,6-tricloropiridina-2-carboxílico.....	9.07
Acido 2,4-dicloro fenoxiacético.....	33.00
Ingredientes Inertes.....	71.93

Contiene: 420.7 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

DENSIDAD: 1.14 g/ml a 20°C

Contenido neto:



**ATENCIÓN**  
**ANTÍDOTO: NO TIENE**

FORMULADOR:  
ANASAC CHILE S.A.  
Almirante Pastene 300,  
Providencia, Santiago, CHILE  
Teléfono: 56-2-24869000  
www.anasac.com

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Causa irritación de la piel, ojos, nariz y garganta, dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, vertigo, dolor de cabeza, espasmos musculares, taquicardia.

PRIMEROS AUXILIOS:

**EN CASO DE INGESTIÓN:** Administre una tasa de agua solo si el afectado está consciente, pero no provoque el VÓMITO, debido a riesgos respiratorios. Administre carbón activado. Obtenga Atención médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

**EN CASO DE INHALACIÓN:** retire el paciente a un lugar ventilado y manténgalo en reposo. Si es necesario administre respiración artificial. Obtenga atención médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** lave bien los ojos con suero isotónico y si la irritación persiste consulte un oftalmólogo.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

TRATAMIENTO MÉDICO:

El tratamiento deberá ser sintomático y de sostén. No tiene antídoto específico.