

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS, MASCARILLAS, LENTES, GUANTES, DOSIFICADOR Y APLICADOR.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

**INGESTIÓN:** En caso de ingestión se produce irritación salivación, náuseas, vómitos, salivación y diarrea. Síntomas neurológicos más probables: cefalea, irritabilidad, somnolencia, vértigo, incoordinación locomotora, dolor al caminar.

**INHALACIÓN:** Irritación de las vías respiratorias.

**CONTACTO CON LOS OJOS:** En caso de contacto ocular, irritaciones oculares leves a moderadas.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Irritación dérmica leve.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**INGESTIÓN:** Solo en caso de ingestión reciente, administre una taza de agua, pero NO PROVOQUE VÓMITOS, los componentes pueden generar complicaciones pulmonares. Por otra parte los componentes son de baja toxicidad aguda. Traslade al paciente al hospital más cercano y lleve en lo posible la etiqueta o el envase del producto.

**INHALACIÓN:** Traslade al paciente al aire libre y fresco y manténgalo en reposo.

**CONTACTO CON LOS OJOS:** En caso de contacto ocular, lave bien los ojos con agua limpia, durante 15 minutos.

**CONTACTO CON LA PIEL:** En caso de contacto, retire la ropa contaminada, luego lave la piel inmediatamente con agua fría y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

**TRATAMIENTO MÉDICO:** En caso de exposición de la piel, lave intensamente con agua fría y jabón. Ante contacto ocular: lavar los ojos, levantando y separando los párpados. Si se presenta irritación (lagrimeo) y dolor o hinchazón el paciente debe ser tratado por un especialista. En caso de inhalación controle posibles irritaciones de las vías respiratorias. En caso de ingestión, diluir con mediana cantidad de agua, realizar aspiración nasogástrica cuidadosa, por la presencia del solvente monoetilenglicol. Luego proceder a lavar el estómago con suero salino, en forma cuidadosa. Finalmente administrar 30 gramos de carbón activado suspendidos en 500 cc de suero. Si no se presenta actividad intestinal, se puede usar un laxante salino como sulfato de sodio.



# TIAGO GOLD 32.5 SC

FUNGICIDA - ESTROBILURINA, TRIAZOL  
AZOXYSTROBIN, DIFENOCONAZOLE

**Composición química:**

	p/v
Methyl(E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate .....	20,0%
Cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether .....	12,5%
Ingredientes inertes .....	67,5%
Total .....	100%

Contiene: 325 gramos de ingredientes activos por Litro de producto comercial.

**Contenido neto:**

## PRECAUCION ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADO POR:  
ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC  
CROP SCIENCE CO. LTD.  
Town South Donghua District, Longyou  
Country, Zhejiang, China.  
Tel: +86-(0)570-7855158

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.



TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS

**AVISO DE GARANTÍA:** El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo no ofrece garantía por el resultado del producto, ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis, considerando las tolerancias de residuos y siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados, impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alternen su modo de acción. La empresa no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
HONDURAS	620 – 449 – II	31/08/2016

N° DE LOTE:  
FECHA DE FORMULACIÓN:  
FECHA DE VENCIMIENTO: