

CARÁCTERÍSTICAS Y FORMAS DE ACCIÓN DEL PRODUCTO: ÓTIMO es un fungicida con acción combinada; ciproconazol actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol de manera rápida y eficaz mientras que picoxistrobin, actúa inhibiendo la germinación de esporas y la penetración del hongo a la planta previniendo e impidiendo el desarrollo y avance de la infección del hongo.

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD	Nombre Científico	DOSIS
SOJA	Roya	<i>Phakopsora pachyrhizi</i>	0,4 L/ha
	Mancha Ojo de Rana	<i>Cercospora sojina</i>	0,4 L/ha

Momento de aplicación: Realizar hasta 2 aplicaciones por temporada dependiendo de las condiciones medioambientales que favorezcan la manifestación de la enfermedad. Iniciar las aplicaciones cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo. Asegure aplicar con un volumen de agua que garantice una óptima cobertura del cultivo.

Condiciones en que el producto puede o no ser utilizado: Leer cuidadosamente la etiqueta y seguir las instrucciones de uso, al preparar la mezcla utilice ropa de protección individual y el equipo adecuado (jarras graduadas, palos para mezclar, embudo y filtro). Aplicar en dirección al viento, nunca en contra porque podría ser peligroso para el aplicador y por la deriva a cultivos o áreas vecinas. No aplicar con vientos mayores a 10 km/hora. Realizar la aplicación preferentemente en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la mañana. No aplicar si hay amenaza de lluvia inminente, ni sobre el follaje mojado o en un ambiente con excesiva neblina o rocío. No aplicar si la humedad relativa está por debajo del 60%. No aplicar con temperaturas superiores a los 30°C.

Método de Aplicación: puede ser aplicado con máquinas pulverizadoras convencionales de arrastre o autopropulsadas. Para un buen control es indispensable lograr una buena penetración del producto y una cobertura total y uniforme del cultivo. Se recomienda alcanzar una densidad de 50-70 gotas/cm². Utilizar equipos calibrados para un volumen de aplicación de 100-200 litros/ha de agua. No aplicar durante las horas más calurosas del día, si el follaje se encuentra mojado o ante inminentes lluvias. No aplicar con viento superior a 10 km/h. Evitar la deriva hacia cultivos adyacentes.

Incompatibilidad: ÓTIMO es compatible con la mayoría de agroquímicos existentes en el mercado, sin embargo se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad en pequeñas áreas antes de realizar mezclas con otros productos.

Fitotoxicidad: ÓTIMO no es Fitotóxico a las dosis recomendadas en esta etiqueta, y no tiene ningún efecto perjudicial sobre cultivos sucesivos.

Periodo de Carencia: 30 días.

Tiempo de reingreso: Se recomienda no ingresar al lote tratado sin vestimenta de protección adecuada hasta transcurridas 24 horas desde la aplicación. En el caso de aplicaciones incorporadas al suelo, puede ingresarse al lote siempre que no se entre en contacto con el material tratado.

CUIDADO

