


FUNGICIDA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
N° de Registro: 4273
Titular del Registro: ANASAC DOMINICANA
País: REPÚBLICA DOMINICANA
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Ingrediente Activo:

AZOXYSTROBIN	20,00% m/v
TEBUCONAZOLE	12,5% m/v
Ingredientes inertes	67,5% m/v

GENERALIDADES
ANASAC IMPERIO 32.5 SC es un fungicida de acción sistémica, preventiva, curativa y erradicante.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>), Mancha Marrón (<i>Helminthosporium sp.</i>), Escaldado de la hoja (<i>Rhynchosporium sp.</i>), Pudrición de la vaina (<i>Sarocladium oryzae</i>), Piricularia (<i>Pyricularia oryzae</i>)	0.4 - 0.5	-
Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	Mildeo polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	1.25 cc/l	1.00 - 1.25 cc/L agua Volumen de agua de 1000 - 1200 L agua/ha
Banano, Plátano (<i>Musa acuminata AA</i>)	Sigatoka Negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	0.4 - 0.5	-
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>) Tomate (<i>Solanum lycopersicon</i>) (<i>sinon. L. esculentum</i>) Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>) Oidio (<i>Leveillulla taurica</i>)	0.5	-

Ajo (<i>Allium sativum</i>) Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Alternaria (<i>Alternaria porri</i>), Mildiu (<i>Peronospora destructor</i>)	0.5	-
Melón (<i>Cucumis melo</i>) Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>) Pepino (<i>Cucumis sativus</i>)	Mildiu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), Fusarium (<i>Fusarium spp.</i>), Gomisis (<i>Didymela bryoniae</i>), Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>)	0.5	-
Café (<i>Coffea arabica L.</i>)	Cercospora (<i>Mancha de Hierro</i>) (<i>Cercospora coffeicola</i>), Ojo de Gallo (<i>Mycena citricolor</i>), Roya (<i>Hemileia vastratix</i>), Antracnosis (<i>Colletotrichum sp.</i>)	0.4 - 0.5	-
Aguacate (<i>Persea americana</i>)	Actracnosis (<i>Colletotrichum spp.</i>) Cercospora (<i>Cercospora sp</i>) Tizon (<i>Phytophthora sp</i>)	0.5	Aplicar con un volumen de agua de 400-600L/ha. Por avión debe aplicarse con un volumen de agua de 40 L/ha.
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Actracnosis (<i>Colletotrichum spp.</i>) Cercospora (<i>Cercospora sp</i>) Tizon (<i>Phytophthora sp</i>)	0.5	Aplicar con un volumen de agua de 200L/ha. Por avión debe aplicarse con un volumen de agua de 40 L/ha.
Cítricos	Actracnosis (<i>Colletotrichum spp.</i>) Cercospora (<i>Cercospora sp</i>) Tizon (<i>Phytophthora sp</i>)	0.5	Aplicar con un volumen de agua de 400-600L/ha. Por avión debe aplicarse con un volumen de agua de 40 L/ha.
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	Actracnosis (<i>Colletotrichum spp.</i>) Cercospora (<i>Cercospora sp</i>) Tizon (<i>Phytophthora sp</i>)	0.5	Aplicar con un volumen de agua de 400-600L/ha. Por avión debe aplicarse con un volumen de agua de 40 L/ha.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Puede aplicarse con equipo terrestre, aspersora de mochila o equipo accionado por tractor, con un volumen de agua de 200L/ha. Por avión debe aplicarse con un volumen de agua de 40 L/ha. Debe asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado y calibrados para una buena distribución y tamaño de la gota uniforme. Antes de aplicar ANASAC IMPERIO 32.5 SC calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelo. Utilice el equipo de protección personal, antes de usar y manipular este producto.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Medir la dosis requerida de ANASAC IMPERIO 32.5 SC y diluir previamente en un balde con agua, luego agregar al estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y el agitador en marcha. Terminar de llenar el estanque y aplicar la mezcla siempre con el agitador en funcionamiento. Al finalizar la aplicación, lavar el equipo prolijamente para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 15 días (No realizar más de 3 aplicaciones año).

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA: Bananno y ornamentales: 0 días. Aguacate 35 días. Cítricos: 15 días. Arroz, papa, tomate, pimiento, ajo, cebolla, melón, sandía pepino, café: 14 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda esperar 12 horas antes de reingresar a las áreas tratadas o realizar cualquier labor en las mismas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. En caso de duda con respecto a la compatibilidad del producto realizar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

FITOTOXICIDAD: No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de este panfleto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Los usuarios del producto, deben lavarse bien las manos antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño. Lavar abundantemente después de usar. No trabajar en la neblina del líquido o con viento. Para la mezcla, aplicación del producto y lavado de equipo de aplicación, use la ropa de protección: sombrero, protector de ojos, mascarilla, camisa manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evitar el contacto directo con el producto. Evite aspirar la llovizna de aspersión. Bañarse con suficiente agua y jabón después de la jornada de trabajo y póngase ropa limpia. Use ropa limpia en cada jornada de trabajo. No lave la ropa de trabajo y equipo de protección junto con la ropa de uso normal.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de los niños y los alimentos domésticos. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: INGESTIÓN: No se conocen síntomas de intoxicación en humanos.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: El tratamiento deberá ser sintomático y de sostén.

ANTIDOTO: NO TIENE.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

TOXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

EN CASO DE DERRAMES, AISLAR LA ZONA AFECTADA, SI ES POSIBLE CONTENER EL DERRAME CON SUSTANCIAS INERTES.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES

Los envases vacíos lávelos con agua, destrúyalos perforándolos para evitar su reutilización. Una vez inutilizados, trasladar a la empresa distribuidora, quien se encargará de remitir al centro de acopio.

Aplicar TRIPLE LAVADO a los envases utilizados. Un envase lavado tres veces reduce el riesgo de contaminación humana, animales domésticos y medio ambiente. Recomendamos proceder de la siguiente forma: después de escurrir bien el envase, agregar agua limpia al envase vacío, hasta la cuarta parte de su capacidad, tapanlo y agitarlo por 30 segundos. Luego vaciar el contenido en el tanque de mezcla. Esta acción deberá repetirse dos veces más. Después el envase deberá ser perforado para evitar su reutilización.

PRESENTACIONES:

Importado y distribuido por:

Titular del registro:

ANASAC DOMINICANA

Calle Victor Garrido Puello N° 14. Edificio profesional Doña Ana Suite 203, Piantini. Santo Domingo, República Dominicana

**USO AGRONÓMICO
ATENCIÓN**

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADAR AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MAS CERCAÑO Y ENTREGUE LA ETIQUETA O EL PANFLETO. COMUNIQUESE CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE DROGAS Y DE INTOXICACIONES (1-809) 562-6601 Ext. 1801.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo, no ofrece garantía por el resultado del producto, ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis, considerando las tolerancias de residuos y siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados, impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alternen su modo de acción. La empresa no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.