

FUNGICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

N° de Registro: 4656

Titular del Registro: ANASAC DOMINICANA

País: REPÚBLICA DOMINICANA

#### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

##### Ingrediente Activo:

CLOROTALONIL .....	50.00% m/v
DIMETOMORPH .....	10.80% m/v
Ingredientes inertes .....	69.20% m/v

#### GENERALIDADES

**GALEON 60.8 SC** es un fungicida formado por: Clorotalonil es un fungicida que pertenece al grupo de los cloronitrilos, de acción multisectorial. Impide que el hongo pueda obtener energía necesaria para sus procesos vitales. Actúa por contacto sobre las esporas de los hongos antes de la germinación, e impide la penetración de aquellos en las células. Y Dimetomorf es un fungicida oomicetal que actúa por interrupción de la formación de la pared celular de los hongos. Interfiere en el normal crecimiento del hongo y puede llevar a la lisis de la pared celular y muerte de las células. La actividad antiesporulante del dimetomorf disminuye notablemente el potencial de diseminación de la infección.

#### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Tizón Tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> )	2.1	Se realizarán 2 a 4 aplicaciones para cada cultivo al inicio preventivo y luego cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, con intervalos de 4 a 7 días dependiendo de las condiciones de incidencia.
Ají ( <i>Capsicum annuum</i> )	Damping off ( <i>Phytophthora spp.</i> )	2.0	
Ajo ( <i>Allium sativum</i> )	Tizón Tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> )	2.0	
Cebolla ( <i>Allium cepa</i> )	Mildiu algodonoso ( <i>Pernospora destructor</i> )	2.0	
Tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> )	Tizón Tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> )	1.8	Se realizarán 2 aplicaciones con intervalo de 7 días.
Melón ( <i>Cucumis melo</i> )	Mildiu algodonoso ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	2.0	Aplicarse cada 10-14 días según las condiciones climáticas y la incidencia de la enfermedad.
Sandía ( <i>Citrullus lanatus</i> )	Mildiu algodonoso ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	2.0	
Rosal ( <i>Rosa spp.</i> )	Mildiu velloso ( <i>Pernospora sparsa</i> )	1.9	Se realizarán 2 aplicaciones con intervalo de 5 o 7 días.

### **EQUIPO DE APLICACIÓN**

Puede aplicarse con equipo terrestre, aspersora de mochila o equipo accionado por tractor. Asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado y calibrados para una buena distribución y tamaño de la gota uniforme. Antes de aplicar GALEON 60.8 SC calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Antes y después de ser usado, el equipo de aplicación debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón. Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarillas, overol, guantes y botas de hule.

### **FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA**

Medir la dosis requerida de GALEON 60.8 y diluir previamente en un balde con agua, luego agregar al estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y el agitador en marcha. Terminar de llenar el estanque y aplicar la mezcla siempre con el agitador en funcionamiento. Recuerde brindar mantenimiento permanente al equipo de aplicación. El equipo y los utensilios usados durante la preparación de la mezcla, deben ser lavados después de cada jornada de trabajo. Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarillas, overol, guantes y botas de hule.

**pH DEL AGUA DE APLICACIÓN:** 7.

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** Papa, Ají, Ajo y Cebolla: Se realizarán 2 a 4 aplicaciones para cada cultivo al inicio preventivo y luego cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, con intervalos de 4 a 7 días dependiendo de las condiciones de incidencia. Tomate: Se realizarán 2 aplicaciones con intervalo de 7 días. Rosal: Se realizarán 2 aplicaciones con intervalo de 5 o 7 días. Melón y Sandía: Aplíquese cada 10-14 días según las condiciones climáticas y la incidencia de la enfermedad.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA:** 28 días.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** 24 horas o utilizar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. En caso de duda con respecto a la compatibilidad del producto realizar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

Los usuarios del producto, deben lavarse bien las manos antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño. Lavar abundantemente después de usar. No trabajar en la neblina del líquido o con viento. Para la mezcla, aplicación del producto y lavado de equipo de aplicación, use la ropa de protección: sombrero, protector de ojos, mascarilla, camisa manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evitar el contacto directo con el producto. Evite aspirar la llovizna de aspersión. Bañarse con suficiente agua y jabón después de la jornada de trabajo y póngase ropa limpia. Use ropa limpia en cada jornada de trabajo. No lave la ropa de trabajo y equipo de protección junto con la ropa de uso normal.

### **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE**

No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de los niños y los alimentos domésticos. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**

**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE,**

**MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.  
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.  
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** En caso de contacto ocular se presenta irritación y ante inhalación se presenta irritación de las vías respiratorias. En caso de ingestión se puede presentar vómitos, diarrea y mayor motilidad intestinal. Los síntomas de mayor latencia serían: vacuolización del epitelio de los túbulos renales, disminución de la actividad, ataxia y temblores. Además, posibles alteraciones en los niveles de glutatión GSH a nivel hepático y renal.

#### **PRIMEROS AUXILIOS**

**EN CASO DE INGESTIÓN:** Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque ayuda médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite inmediatamente la ropa contaminada y lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón. Obtenga atención médica.

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Obtenga atención médica.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

#### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS.**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

**RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.**

**ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.**

#### **MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES**

Los envases vacíos deben realizarles el triple lavado perforarse y luego depositarse en un centro de acopio autorizado por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

**Importado y distribuido por:**

**Titular del registro:**

**ANASAC DOMINICANA**

Calle Victor Garrido Puello N° 14. Edificio profesional Doña Ana Suite 203, Piantini. Santo Domingo, República Dominicana

**ATENCIÓN**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADAR AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MAS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA O EL PANFLETO. COMUNIQUESE CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE DROGAS Y DE INTOXICACIONES (1-809) 562-6601 Ext. 1801.**

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.  
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.  
UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.  
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.  
ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑO A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.  
“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”  
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”  
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”**

#### **INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo, no ofrece garantía por el resultado del producto, ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis, considerando las tolerancias de residuos y siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados, impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alternen su modo de acción. La empresa no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.