

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**

**POTASIO (K<sub>2</sub>O)** ..... **20,0% p/p**

**GENERALIDADES**

**CRECITEC K** es un abono foliar a base de K. Desde el punto de vista nutricional aporta Potasio (K), además de corregir deficiencias de estos elementos durante las etapas de mayor consumo, potencia los sistemas naturales de defensa de las plantas. Debido a su novedosa formulación de alta absorción y compatibilidad, le confiere buena sistemia, pues sus elementos son asimilables en su totalidad. **CRECITEC K** puede ser aplicado vía foliar. Proporciona una elevada respuesta en diferentes cultivos al favorecer procesos metabólicos y fisiológicos.

**RECOMENDACIONES DE USO: Dosis para 200 litros de agua.**

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACIÓN	VÍA DE APLICACIÓN
Frutales	1 a 2 L/ha.	Efectuar 2-3 aplicaciones, desde frutos cuajados hasta inicio de formación de color en frutos.	Vía foliar o fertirriego
Café ( <i>Coffea arabica</i> ), Cacao ( <i>Theobroma cacao</i> )	1 a 2 L/ha.	Efectuar 2-3 aplicaciones con frutos cuajados.	Vía foliar o fertirriego
Tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> ), Pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> )	1 a 2 L/ha.	Efectuar 2-3 aplicaciones con frutos cuajados.	Vía foliar o fertirriego
Ajo ( <i>Allium sativum</i> ), Cebolla ( <i>Allium cepa</i> )	1 a 2 L/ha.	Aplicar 30 y 15 días antes de cosecha.	Vía foliar o fertirriego
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	1 a 2 L/ha.	1ª Al inicio de formación de los estolones, 2ª Al inicio del crecimiento de los tubérculos.	Vía foliar o fertirriego
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	1 a 2 L/ha.	Realizar aplicaciones al inicio de emisión de panoja.	Vía foliar o fertirriego
Melón ( <i>Cucumis melo</i> ), Sandía ( <i>Citrullus lanatus</i> )	1 a 2 L/ha.	Aplicar desde fructificación a fin de cosecha.	Vía foliar o fertirriego
Otras Hortalizas	1 a 2 L/ha.	Aplicar durante amarre de fruto.	Vía foliar o fertirriego
Frijol ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ), Arveja ( <i>Pisum sativum</i> )	1 a 2 L/ha.	Realizar aplicación posterior al cuajado.	Vía foliar o fertirriego

Cítricos	1 a 2 L/ha.	Realizar de 2 a 3 aplicaciones con frutos cuajados.	Vía foliar o fertirriego
Uva ( <i>Vitis vinifera</i> )	1 a 2 L/ha.	En variedades de color efectuar de 2 a 3 aplicaciones desde bayas de 5 mm hasta pinta.	Vía foliar o fertirriego
Fresa ( <i>Fragaria x ananassa</i> ), Arándano ( <i>Vaccinium myrtillus</i> ), Frambuesa ( <i>Rubus idaeus</i> )	1 a 2 L/ha.	Realizar de 2 a 3 aplicaciones con frutos cuajados.	Vía foliar o fertirriego

“La información presentada sirve como referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”.

### FORMA DE APLICACIÓN

El producto puede ser aplicado vía foliar o fertirriego, mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelos.

### EQUIPO DE APLICACIÓN

A pesar de que el producto es inocuo y no presenta un peligro para el aplicador deben ser tomadas las precauciones siguientes: Durante el manejo y lavado del equipo de aplicación, se debe utilizar el equipo de protección completo: Pantalón largo, camisa manga larga, botas de hule, mascarilla, protector de ojos y guantes.

### PRECAUCIONES

No aplicar en horas de máximo calor. Almacenar en este mismo envase en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. Puede irritar la piel y los ojos.

**COMPATIBILIDAD:** CRECITEC K es incompatible con productos de reacción muy alcalina. CRECITEC K debe ser aplicado en solución con pH entre 5 a 8.

**PRESENTACIONES:** 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l.


**“CONSERVÉSE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”  
“ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO”**



**EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL:** 1800 – VENENO (836366)  
Atención las 24 horas del día o al Titular del Registro AGROCHILE S.A.  
Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

**FABRICANTE Y FORMULADOR:**  
**ANASAC CHILE S.A.**  
Almirante Pastene 300, Providencia.  
Santiago-Chile.  
Teléfono: (56-2) 24706800


**TITULAR DEL REGISTRO:**  
**AGROCHILE S.A.**  
Valderrama N31-27 y Av. Mariana de  
Jesús, conjunto La Granja Bloque ED  
231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito,  
Ecuador. Teléfono: 6020273

<p><b>“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”</b> <b>“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”</b> <b>“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”</b> <b>“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”</b> <b>“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”</b> <b>“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”</b></p>	
---	---

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

#### **INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



[www.anasac.com/international](http://www.anasac.com/international)