



**FUNGICIDA**  
**POLVO MOJABLE (WP)**  
**N° de Registro: 405**  
**Titular del Registro: ANASAC**  
**País: HONDURAS**

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**
**Ingrediente Activo:**

<b>MANCOZEB</b> .....	<b>64.0% p/p</b>
<b>CIMOXANILO</b> .....	<b>8.0% p/p</b>
<b>Ingredientes inertes c.s.p.</b> .....	<b>28.0% p/p</b>

**GENERALIDADES**

**MOXAN MZ 72 WP** es un fungicida con acción sistémica y de contacto, para uso en forma preventiva y curativa.

**RECOMENDACIONES DE USO**

<b>CULTIVO</b>	<b>ENFERMEDAD</b>	<b>DOSIS</b>
Tabaco ( <i>Nicotiana tabacum</i> )	Moho azul ( <i>Peronospora tabaci</i> )	2 – 3 kg/Ha
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Tizón tardío ( <i>Phytophthora infectans</i> )	2 – 3 kg/Ha
Tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> )	Tizón tardío ( <i>Phytophthora infectans</i> )	2 – 3 kg/Ha
Melón ( <i>Cucumis melo</i> )	Mildiu lanoso ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	2 – 3 kg/Ha
Pepino ( <i>Cucumis sativus</i> )	Mildiu lanoso ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	2 – 3 kg/Ha
Sandía ( <i>Citrullus vulgaris</i> )	Mildiu lanoso ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	2 – 3 kg/Ha
Lechuga ( <i>Lactuca sativa</i> )	Mildiu lanoso ( <i>Bremia lactucae</i> )	2 – 3 kg/Ha
Cebolla ( <i>Allium cepa</i> )	Mildiu lanoso ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	2 – 3 kg/Ha

### **EQUIPO DE APLICACIÓN**

Este producto puede aplicarse con aspersora de mochila sin boquilla. Con un volumen de aplicación entre 400-600 litros/ha También puede ser aplicado mediante riego por goteo o excepcionalmente con equipo convencional o de Motor, en aplicación foliar utilizando boquillas de cono. Calibre su equipo de aplicación. El equipo y los utensilios empleados en mezcla y aplicación del producto deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco lejos de fuentes de agua. Debe usar el equipo de protección durante el lavado del equipo de aplicación. No presenta ningún tipo de acción perjudicial sobre el equipo de aplicación.

### **FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA**

Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua a utilizar, agregar la dosis requerida de MOXAN MZ 72 WP. Luego rellenar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo siempre agitación constante. Si se aplica con un coadyuvante, agregar este al final, previamente disuelto en agua.

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** 5 días.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA:** 0 días para ornamentales. 21 días para cucurbitáceas.

**INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:** 24 horas.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos y las dosis indicadas.

**COMPATIBILIDAD:** No se recomienda mezclar MOXAN MZ 72WP con productos altamente alcalinos. Cuando no conozca su compatibilidad realice pruebas.

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

Los usuarios deben lavarse bien las manos antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño. Lavar abundantemente después de usar.

No trabajar en la neblina del líquido o con viento.

Para la mezcla, aplicación del producto y lavado de equipo de aplicación, use la ropa de protección: sombrero, protector de ojos, mascarilla, camisa manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evitar el contacto directo con el producto. Evite aspirar la llovizna de aspersión. Bañarse con eficiente agua y jabón después de la jornada de trabajo y póngase ropa limpia. Use ropa limpia en cada jornada de trabajo. No lave la ropa de trabajo y equipo de protección junto con la ropa de uso normal.

### **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico.

No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de los niños y los alimentos domésticos Conserve el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.**

**BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**

### **SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Irritación cutánea y ocular. Irritación del sistema gastrointestinal, náuseas, vómitos y dolor de cabeza.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**INGESTIÓN:** Administre una taza de agua sólo si el afectado está consciente, pero NO PROVOQUE EL VÓMITO, debido a riesgos respiratorios. Obtenga atención médica.

**INHALACIÓN:** Retire al paciente de la zona de contaminada, llévelo a un lugar fresco y aireado, bajo sombra y bien ventilado: Si la persona esta consciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, si es necesario practíquele respiración artificial mientras es llevado al médico.

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Lave inmediatamente con agua durante por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Lave la parte afectada con abundante agua y jabón.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:** No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático y de soporte. En caso de intoxicación notificar al Ministerio de Salud.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

TÓXICO PARA ABEJAS.

TOXICO PARA PECES Y/O CRUSTACEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Realizar un triple lavado y enviarlos al centro de acopio más cercano para su traslado y destrucción de acuerdo a las leyes nacionales.

**PRESENTACIONES:**

Importado y distribuido por:

Titular del registro:

ANASAC

**USO AGRICOLA  
PRECAUCIÓN**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. COMUNIQUESE CON EL HOSPITAL ESCUELA (504) 2232 2322

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”  
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”  
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”  
“EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE”  
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”  
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”  
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantiza la eficacia del producto, siempre y cuando se le de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado.