

**FUNGICIDA**
**EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)**
**N° de Registro: 2922 - 2565**
**Titular del Registro: ANASAC PARAGUAY S.R.L.**
**País: PARAGUAY**
**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**
**Ingrediente Activo:**
**TEBUCONAZOLE ..... 25% p/v**
**Auxiliares de formulación y sustancias acompañantes c.s.p. .... 100% p/v**
**GENERALIDADES**
**TACORA 25 EW** es un fungicida que actúa en forma sistémica, preventiva, curativa y erradicante sobre hongos que causan enfermedades en trigo, arroz, maíz, soja, maní, girasol y hortalizas.

**RECOMENDACIONES DE USO**

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS ml/100 L agua	DOSIS cc/ha	OBSERVACIONES
Soja	Roya ( <i>Phakopsora sp.</i> ) Oidio ( <i>Microsphaera diffusa</i> ) Mancha parda ( <i>Septoria sp</i> ) Cercosporiosis ( <i>Cercospora sp</i> )		400-500	Al inicio de la formación de vainas.
Trigo	Oidio ( <i>Erisiphe graminis tritici</i> ) Roya de la hoja ( <i>Puccinia recondita</i> ) Roya del tallo ( <i>Puccinia graminis tritici</i> ) Septoriosos ( <i>Septoria nodorum, S. tritici</i> ) Manchas amarillas ( <i>Dreschlera sp.</i> ) Giberella ( <i>Fusarium graminearum</i> )		500-750	Comenzar la aplicación al observar los primeros signos de la enfermedad, es decir al observar las primeras manchas y/o pústulas sobre el follaje.
Arroz	Brusona ( <i>P. oryzae</i> ) Mancha parda ( <i>Helmiithosporium oryzae</i> )		600	Al aparecer los primeros síntomas.
Maíz Sorgo	Helmintosporiosis ( <i>Helminthosporium turcicum</i> ) Royas ( <i>Puccinia sorghi</i> )		600	Al observarse las primeras manchas y/o pústulas.
Girasol	Royas ( <i>Puccinia sp</i> )		400-600	Al observarse las primeras manchas y/o pústulas.
Hortalizas Ceb. de hoja Poroto Tomate Melón Sandía Zapallo	Royas ( <i>Puccinia sp</i> ) Oidio ( <i>Erisiphe cichoreacearum</i> ) Mancha negra ( <i>Alternaria sp</i> ) Fusariosis ( <i>Fusarium sp</i> ) Septosporiosis ( <i>Septoria sp</i> )	60-80		Al observarse los primeros síntomas. Aplicar con intervalos de 12 a 15 días.

**INSTRUCCIONES DE USO**

Dependiendo de la dosis, estado vegetativo, método de aplicación, condiciones ambientales y estado sanitario del cultivo, la acción se prolonga hasta por 14 a 21 días.

No aplicar con viento (> 5 km/hr).

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA**

Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis deseada de TACORA 25 EW y rellenar con agua hasta el volumen requerido, manteniendo agitación constante. En aplicaciones aéreas usar como mínimo 30 litros de agua por hectárea. En aplicaciones terrestre usar boquillas de picos cónico y volúmenes de agua no inferior a 200 litros por ha.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con todos los plaguicidas excepto los alcalinos.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta. Aplicar preferentemente en horas frescas del día, evitando hacerlo en horas de mucho calor.

**REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** 12 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección personal.

**PERIODO DE CARENCIA:** Cereales, Maíz, Sorgo, Soja 35 días; Chacras y Hortalizas 2 días; Cereales 2 días y Alfalfa 1 día.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.

INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.

NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR (cuando corresponda).

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos.

Durante la manipulación del producto usar delantal, protector facial, guantes y botas. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek, protector facial, guantes y botas.

En caso de realizar una aplicación vía aérea se recomienda que el piloto use ropa de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área de aplicación a personas y animales.

No comer, beber o fumar durante la aplicación.

Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

**DESTINO DE LOS ENVASES**

LOS ENVASES VACÍOS DEBERÁN SER ENJUAGADOS TRES VECES (TRIPLE LAVADO) Y EL LÍQUIDO RESULTANTE AGREGARLO A LA PREPARACIÓN PARA SER PULVERIZADA, PERFORAR EL ENVASE Y ALMACENE EN LUGAR ADECUADO HASTA POSTERIOR RECICLADO.

**ANTIDOTO:** No existe antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de intoxicación:** mientras se practican los primeros auxilios, conseguir ayuda médica inmediatamente.

**Contacto ocular:** Inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.

**Contacto dermal:** Quitar la ropa contaminada y lavar la piel, los cabellos y las mucosas con agua y jabón o con agua bicarbonatada (diluir un sobre de bicarbonato de sodio en un litro de agua).

**Inhalación:** Trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada.

#### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

**TACORA 25 EW** es prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces, microcrustáceos acuáticos y abejas.

Conserve **TACORA 25 EW**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.

#### **Importado y distribuido por:**

**IMPORTADORA ALEMANA S.A.**

Sta. Margarita de Youville c /Mde. Lynch  
Providencia Tel/Fax: 674157/8 – 684110  
ASUNCION – PARAGUAY

#### **Titular del registro:**

**ANASAC PARAGUAY S.R.L.**

Lord Baden Powell n°857 - Asunción  
Teléfono: +59521447739

**USO AGRICOLA  
NO INFLAMABLE  
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV - POCO PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAMAR AL TELÉFONO 021-220-418 DEL CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”**  
**“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”**  
**“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”**  
**“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”**  
**“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”**  
**“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”**

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

#### **INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad. Por tanto, garantizamos el porcentaje de Ingredientes Activo de los envases debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación escapan a nuestro control el usuario es el responsable final, por tanto, no asumimos los riesgos de su aplicación y almacenaje.